

Sperimentazione PDTA Demenze – Set minimo di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati

1. Assistiti in terapia con farmaci antidemenza

Razionale	Misura la capacità dei servizi di identificare le demenze in fase non avanzata e di impostare la terapia farmacologica. Tra gli assistiti dei medici delle AFT coinvolte nella sperimentazione, ci si attende che il valore di questo indicatore sia superiore alla media regionale.
Metodo di calcolo	<i>Numeratore:</i> assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte ad inizio sperimentazione per i quali nei 6 e 12 mesi successivi all'avvio della sperimentazione sono state effettuate almeno 2 erogazioni di farmaci anti-demenza in date distinte <i>Denominatore:</i> assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte nella sperimentazione ad inizio sperimentazione.
Riferimenti	Media di zona-distretto, aziendale e regionale
Fonte dati	Anagrafe sanitaria, flussi DOC SPF e FED
Nota	L'indicatore sarà aggiustato per età e sesso della popolazione in carico.

2. Prevalenza di assistiti in terapia con antipsicotici atipici tra gli assistiti in terapia con farmaci antidemenza

Razionale	Misura la capacità dei servizi di identificare disturbi del comportamento legati alla demenza in fase non avanzata e di impostare la terapia farmacologica. Tra gli assistiti dei medici delle AFT coinvolte nella sperimentazione, ci si attende che il valore di questo indicatore sia superiore alla media regionale.
Metodo di calcolo	<i>Numeratore:</i> assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte ad inizio sperimentazione in terapia con farmaci anti-demenza nei 12 mesi antecedenti l'avvio della sperimentazione, per i quali nei 12 mesi successivi all'avvio della sperimentazione sono state effettuate almeno 2 erogazioni di farmaci antipsicotici atipici <i>Denominatore:</i> assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte ad inizio sperimentazione in terapia con farmaci anti-demenza nei 12 mesi antecedenti l'avvio della sperimentazione
Riferimenti	Media di zona-distretto, aziendale e regionale
Fonte dati	Anagrafe sanitaria, flussi DOC SPF e FED
Nota	L'indicatore sarà aggiustato per età e sesso della popolazione in carico

3. Tasso di ricovero temporaneo in posti letto dedicati in RSA con segnalazione da parte del medico specialista in pazienti con diagnosi di demenza

Razionale	Misura la capacità delle cure primarie e dei servizi specialistici di intercettare scompensi comportamentali nei pazienti con demenza e di usufruire dei servizi residenziali dedicati nell'ambito della sperimentazione a tali pazienti con finalità terapeutiche
Metodo di calcolo	<i>Numeratore:</i> numero di accessi in servizi residenziali dedicati effettuati dagli assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte ad inizio sperimentazione nei 6 e 12 mesi successivi all'inizio della sperimentazione stessa con segnalazione "medico specialista" e diagnosi di demenza
	<i>Denominatore:</i> assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte nella sperimentazione ad inizio sperimentazione.
Riferimenti	Media di zona-distretto, aziendale e regionale
Fonte dati	Anagrafe sanitaria, flussi DOC AD-RSA
Nota	L'indicatore sarà aggiustato per età e sesso della popolazione in carico.

4. Tasso di accesso al pronto soccorso per gravi disturbi del comportamento in persona con demenza

Razionale	Misura la capacità delle cure primarie e dei servizi specialistici di intercettare scompensi comportamentali nei pazienti con demenza e di mettere in atto azioni che possano prevenire accessi al PS per questa causa
Metodo di calcolo	<i>Numeratore:</i> numero di accessi al Pronto Soccorso effettuati dagli assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte ad inizio sperimentazione nei 6 e 12 mesi successivi all'inizio della sperimentazione stessa con diagnosi di demenza
	<i>Denominatore:</i> assistiti ultra 65enni in carico ai MMG afferenti alle AFT coinvolte nella sperimentazione ad inizio sperimentazione.
Riferimenti	Media di zona-distretto, aziendale e regionale
Fonte dati	Anagrafe sanitaria, flussi DOC PS
Nota	L'indicatore sarà aggiustato per età e sesso della popolazione in carico.